

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 6 от 25.03.2024 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Внесение гербицидов на посевах озимых колосовых



Наступают сроки внесения гербицидов на озимых колосовых культурах. Погодные условия способствуют активной вегетации сорных растений на полях. Экономический порог вредоносности для однолетних двудольных сорняков – 8-10 экз./м², многолетних – 1-2 экз./м², для однолетних злаковых – 15-20 экз./м². Обработку необходимо начинать с хорошо раскустившихся посевов. Оптимальной фазой для применения гербицидов является кущение. Обработки озимых в фазу выхода в трубку про-

водить только разрешенными для этой фазы препаратами. Оптимальная температура для внесения гербицидов +10-25°C, сульфонилмочевины можно применять с +5°C.

Однолетние двудольные сорняки наиболее чувствительны к гербицидам в фазу 2-3 листьев, многолетние в фазу розетки, злаковые виды - 2-3 листа до фазы конца кущения. Гербицидную обработку рекомендуется разделить на два этапа: первый – против двудольных сорных растений, второй - граминицид, или использовать уже готовые смесевые препараты.

Для снятия пестицидного стресса рекомендуем в рабочий раствор добавлять препараты на основе гуминовых кислот и микроэлементы, на посевах со слабым развитием заболеваний – биофунгициды.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

