

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 7 от 6.03. 2023 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Долгоносики на сахарной свекле




На всходах сахарной свеклы отмечается вредоносность долгоносиков. Погодные условия весеннего периода с возвратами холодов определяют растянутый выход жуков из мест зимовки и длительный период вредоносности. Видовой состав долгоносиков разнообразен. Преобладающими видами на посевах сахарной свеклы являются обыкновенный свекловичный, южный серый и серый свекловичный долгоносики. Взрослые долгоносики питаются наземными частями растений, повреждения в фазе всходов приводят к изреживанию густоты посевов; их гибели. Повышенная численность наблюдается на полях с высоким фоном засорения сорняками (вьюнок, осот, щирица, марь) и посевах, граничащих с полями, заселенными вредителями в прошлом году.

При численности долгоносиков выше ЭПВ (0,5-1 экз./м²) рекомендовано провести защитные мероприятия препаратами согласно «Каталогу...».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



Информационный канал
Телеграмм

www.rsc23.ru