

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 13 от 18.04.2023 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Клоп вредная черепашка



Вредная черепашка относится к числу особо опасных вредителей. Выход взрослых клопов из мест зимовки происходит в период установления устойчивой хорошей погоды и повышении среднесуточных температур до 13-17°C и максимальной до 20°C. Первыми на посевах появляются самцы, самки вылетают на 1-3 дня позже. После перелета на посевы озимых колосовых культур взрослые клопы приступают к питанию, прокалывая хоботком основание стебля. Эти уколы в фазу выхода в трубку вызывают гибель центрального листа и отмирание поврежденного стебля. Позже уколы клопа в стебель и колос вызывают частичную или полную белоколосость. Повреждения взрослыми клопами при высокой численности могут вызвать гибель от 10 до 40 % стеблей.

В настоящее время отмечено начало выхода самцов вредной черепашки из мест зимовки. При выявлении 2-4 экз./м² клопов необходимо провести защитные мероприятия препаратами согласно «Каталогу...».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



Информационный канал

Телеграмм



www.rsc23.ru