

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 37 от 08.07. 2021 г.

тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ращпилевская,329

Стеблевой мотылек



На посевах кукурузы отмечается заселение и вредоносность стеблевого мотылька. Отродившиеся гусеницы быстро проникают во внутренние части растения - за влагалища листьев и в метелки кукурузы. Гусеницы имеют резко выраженную миграционную способность и переселяются с одного растения на другое. Повреждения стеблевым мотыльком вызывают ломку стеблей,

пораженность растений стеблевыми гнилями и плесневение.

Эффективны обработки во время внедрения в стебли первых гусениц при численности 1-2 гусеницы на растение.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю проводят работу в области защиты растений: мониторинг посевов, определение видового состава вредителей, экономического порога вредоносности и подбор препаратов для проведения защитных мероприятий

Важно!

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений).

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.