

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 21 от 21.05. 2021 г.

тел. (861) 224-72-31, e-mail: [otdelzr23@yandex.ru](mailto:otdelzr23@yandex.ru)

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329



### Сорняки на кукурузе

Наступают сроки проведения химпрополки кукурузы. Проходящие осадки способствуют активной вегетации сорной растительности. Культуру засоряют более 100 видов сорняков. Наиболее распространенные виды из однолетних –

просо куриное, виды щетинника, щирица обыкновенная, горчица полевая, канатник Теофраста, марь белая, виды лебеды, паслен черный и др.; из многолетних – виды осота, бодяка, латука, вьюнок полевой.

Обработки проводят до фазы 5-7 листьев (оптимально 3-5 листьев) кукурузы и ранние фазы роста сорных растений. Своевременно проведенные агротехнические мероприятия так же снижают засоренность посевов.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю проводят работу в области защиты растений: мониторинг посевов, определение видового состава вредителей, экономического порога вредоносности и подбор препаратов для проведения защитных мероприятий

**Важно!** Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений).

**Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.**