



СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЦЕНТРА

№ 3 от 12.03.2024 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

Курчавость листьев персика



В Краснодарском крае одно из самых опасных заболеваний персика – курчавость листьев, возбудитель заболевания - голосумчатый гриб *Taphrina deformans*. Поражается так же нектарии и миндаль. На восприимчивых сортах развитие достигает 40-60%. Возбудитель зимует между чешуями почек или на коре пораженных побегов. При прохладной погоде в период распускания листовых почек происходит первичное заражение, которое самое вредоносное. Первые симптомы обнаруживаются на листовых пластинках почти сразу после распускания. На верхней стороне листа они проявляются в виде единичных или многочисленных вздутий бледно-зеленого, бледно-желтого или ало-красного цвета. На нижней - пораженные участки вдавлены. Инфицированные ткани утолщены, со временем образуется серо-белый налет гриба, затем листья некротизируются и опадают. Из-за этого деревья ослаблены и снижается урожай.

В настоящий период для профилактики и снижения вредоносности курчавости листьев, особенно на восприимчивых сортах, необходимо провести опрыскивание деревьев медьсодержащими и системными фунгицидами согласно «Каталогу...».

Для предотвращения поражения персика эффективными мероприятиями остаются: выращивание устойчивых сортов, своевременная обрезка и сжигание инфицированных побегов, подкормка деревьев микро- и макроудобрениями.

