

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОС- СЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 27 от 17.05.2023 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Обработка кукурузы гербицидами



Наступили сроки внесения повсходовых гербицидов на посевах кукурузы. Проходящие осадки способствовали активной вегетации сорных растений, поэтому некоторые поля засорены в сильной степени - до 100 экземпляров на квадратном метре. Преобладают двудольные сорняки: виды щирицы, марь белая, канатник Теофраста, сурепка обыкновенная и др., наряду с однолетними встречаются и многолетние виды: бодяк полевой, вьюнок полевой и др. Из злаковых видов преобладают ежовник обыкновенный, виды щетинника, росички и др.

Наиболее эффективно проводить опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений - 2-6 листьев у однолетних двудольных и 1-3 листа у однолетних злаковых сорняков. Многолетние виды уязвимы в фазу розетки двудольных и при высоте 10-15 см злаковых сорняков.

Применение послевсходовых гербицидов в сочетании с агротехническими мероприятиями наиболее эффективно уничтожают сорняки.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

