

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 7 от 14.04.2022 г.

тел. (861) 224-54-07, e-mail: stzr@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

Монилиоз косточковых культур и курчавость листьев персика



В условиях этого года влажная и холодная весна создает угрозу интенсивного поражения косточковых культур монилиальным ожогом и курчавостью листьев персика. Вредоносность болезней может возрасти.

Первые симптомы **монилиоза** проявятся сразу после цветения в виде внезапного усыхания отдельных соцветий, летом плоды будут поражаться монилиальной гнилью и зачастую висеть на дереве до следующей весны, создавая зимующий запас инфекции.

Пораженные цветки долго не опадают. Этим монилиальный ожог отличается от действия заморозков.



Курчавость листьев персика можно обнаружить сразу после распускания почек. На листьях появляются многочисленные вздутия ткани бледно-зеленого, бледно-желтого или ало-красного цвета. Со временем листья некротизируются и

опадают.

Для защиты садов от заболеваний необходимо проводить комплекс обработок системными и контактными фунгицидами с применением ростостимулирующих препаратов и микроэлементов соблюдая регламенты применения.

Для наблюдения за проявлением, распространением и развитием болезней необходимо постоянно вести мониторинг многолетних насаждений.

